

tiCaff®

Citrato de cafeína



Caja x
10 Viales

20 mg/mL
Frasco Vial 1 mL

60 mg/ 3 mL
Frasco Vial 3 mL

*Para uso intravenoso y oral en la misma presentación

INDICADO PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL PREMATURO

“El inicio temprano de la cafeína se asoció a una menor necesidad de soporte ventilatorio invasivo y a una menor incidencia de HIV y DAP”

*Borszewska-Kornacka MK, Hożejowski R, Rutkowska M, Lauterbach R (2017) Shifting the boundaries for early caffeine initiation in neonatal practice: Results of a prospective, multicenter study on very preterm infants with respiratory distress syndrome. PLoS ONE 12 (12) <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189152>

PIONEROS EN COLOMBIA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



2009
Invima



2012
Cofepris



2013
The government of the Bahamas
Ministry of health Bahamas



2015
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria



2016
Certificación de medicamento huérfano



2017
Certificación de medicamento huérfano



2018
Ministerio de Salud Pública



2018
Certificación de medicamento huérfano



www.ankh.com.co



+ (57) 313 395 2023



ventas@ankh.com.co



tiCaff®

Citrato de cafeína



SEGURIDAD Y EFICACIA

Materias primas de **Origen alemán**

PRESENTACIONES



DOSIS <i>tiCaff</i> ®	DOSIS <i>tiCaff</i> ® mg./ Kg.	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	FRECUENCIA
Dosis de carga	20 mg. / Kg.	 Intravenosa * durante 30 min.	Única dosis
Dosis de Mantenimiento	5 mg. / Kg.	 Intravenosa/Oral durante 10 min.	Cada 24 hrs.**

*Utilizando bomba de infusión de jeringa.

**Iniciando 24h después de la dosis de carga.

